

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège
rédigé en collaboration avec MM. Duboin, Escande, Boyer, Moulet, Vène, Faure, Bernard

N° 2 C du 28 Février 1990

GRANDES CULTURES N° 2


COLZA

MELIGETHES - PUCERONS : ces 2 ravageurs sont présents dans toutes les cultures de colza
les seuils d'intervention sont :

pour les méligèthes : 1 méligèthe/pied stade D1

2 à 3 méligèthes/pied stade E

D₁ Boutons accolés encore cachés par les feuilles
terminales



E - Boutons séparés
Les pédoncules floraux s'allongent en commençant par
ceux de la périphérie.



Les méligèthes peuvent occasionner d'importants dégâts à ces stades des plantes; leur
nuisibilité s'efface avec l'apparition des fleurs dont ils consomment le pollen libre

pour les pucerons : 2 colonies au m² en bordure, mais à traiter contre les méligèthes
une population plus faible de pucerons doit être prise en compte, cela peut éviter une
intervention spécifique à brève échéance.

Les pucerons sont susceptibles d'entraîner de très importantes baisses de rendement
(supérieures à 10 qx mesurés dans des essais du SPV Aude)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67 92 41 42



Vous devez observer vos cultures avant toute prise de décisions :

* 1° cas : **Meligèthes seuls** vous avez le choix entre les spécialités suivantes :

FASTAC	0,15 l/ha
TALSTAR	0,1 l
BAYTHROID	0,2 l
DECIS CE	0,2 l
SUMICIDIN 10	0,4 l
MAVRIK	0,2 l
KARATE	0,1 l

* 2° cas : **Pucerons seuls**

SERK	1,5 l
PIRIMOR G	0,5 kg
MAVRIK	0,2 l

* 3° cas : **Pucerons + Meligèthes** c'est le cas le plus probable la solution commune est

MAVRIK	0,2 l
--------	-------

CEREALES

ORGE : Le problème sanitaire dominant reste l'**Oïdium**

Les cultures d'orges arrivent au stade 1 noeud et 2 noeuds pour certaines

A PARTIR DU STADE 1 NOEUD IL FAUT IMPERATIVEMENT TRAITER CES CULTURES où s'observent en plus les 1° symptômes de **Rhynchosporiose** et **Helminthosporiose**.

La **Rouille Naine** reste très discrète mais peut être observée

Si les conditions climatiques présentes, très clémentes, persistent, l'épiaison devrait se faire début Avril; il convient donc d'assurer la protection de ces cultures

Vous pouvez utiliser une des spécialités suivantes :

MAGIC	1,5 l/ha
SUMISTAR	2,5 l
PUNCH C	0,7 à 0,8 l

BLÉS : La pression d'**Oïdium** reste très forte sur les étages inférieurs

La **Rouille Brune** est très discrète

AUCUNE INTERVENTION N'EST A PRATIQUER

sauf cas très exceptionnel (cultures très précoces) à voir avec votre technicien

POIS PROTEAGINEUX

Ces cultures sont saines, aucun traitement n'est à envisager pour le moment

Tirage du 28 Février 1990 - 2000 exemplaires

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - CARCASSONNE 1990 - SPV